



Navodila za uporabo

Slovenščina

OROXID® forte - oralni gel

1. Opis izdelka in namen uporabe: OROXID® forte je gel, ki vsebuje 3 % vodikovega peroksida in se uporablja za vzdrževanje ustne higiente in zdravih dlesni ter kot pomoč pri vnetnih stanjih v ustni votlini. Namenjen je preprečevanju in lajšanju bolezni obzobnih tkiv, kot so npr. razdražene, krvaveče in vnete dlesni. Pomaga pri lajšanju gingivitisa, parodontitisa, poškodb dlesni zaradi posegov, kot je na primer puljenje zob. Za preprečevanje gingivitisa in drugih vnetnih bolezni v ustni votlini je nujno potrebna ustrena usta higiena. Razvoj gingivitisa je pogojen s prisotnostjo zobnih oblog in bakterij.

OROXID® forte zaradi svojih mehaničnih lastnosti in sproščanja kisika v obliki blagega penjenja pozitivno vpliva na mikrookolje poškodovane sluznice. Zato ga priporočamo kot dopolnilno ustno higieno pri fiksnih zobnih aparatih, delnih protezah, fiksnih protetičnih nadomestkih (prevleke, mostički) in zobnih vsadkih. Izboljšuje rezultate ustne higiente pri pacientih z ortodontskimi nepravilnostmi, ki utrejajo običajno zobno higieno. Vodikov peroksid lahko pomaga pri preprečevanju nastanka zobnih oblog/obavarvanosti zob in zadaha. Pomaga tudi pri zmajanjevanju oblog na jeziku in ustni sluznici, običajno pogojenih s prisotnostjo glivinskih povzročiteljev ter odstranjuje zadah. Delovanje je izraženo le na površini, saj vodikov peroksid ne prehaja v globlja tkiva.

OROXID® forte vsebuje kot pomočno snov Actipone® PX3 – izvlček zelišč.

Izdelek je na voljo v obliki gela v pakiranjih po 15 ml, 30 ml in 50 ml.

2. Način uporabe: OROXID® forte se uporablja dva- do trikrat na dan, najbolje po opravljenem ščetkanju zob. Majhno količino gela OROXID® forte (dva do trije pritisni na zaporko) nanesite na čist prst (ki ste ga temeljito umili z vodo) ali na vatisano palčko ter ga nanesite na prizadet predel v ustni votlini. Pustite 30 sekund, da izdelek deluje. Po opravljenem tretmaju gel požvrkljajte z vodo in izpljunite.

Gel OROXID® forte uporabljajte redno vse do izboljšanja stanja oziroma odstranjanja vnetnosti. Če se stanje v obdobju 8 tednov ne izboljša, se posvetujte z zdravnikom. Izdelek OROXID® forte ni namenjen za držanje hujših vnetnih bolezni ustne votline, ki zajemajo tudi globlja tkiva; v tem primeru obiščite zdravnika. Za preventivne namene in vzdrževanje dobne higiente ustne votline uporabljajte izdelek OROXID® forte enkrat na dan na način, kot je opisan zgoraj. Ob nanosu gela se lahko pojavi občutek penjenja, kar kaže na sproščanje aktivnega kisika.

3. Neželeni učinki in preventivni ukrep: Pri uporabi na sluznici lahko vodikov peroksid v nizki koncentraciji redko povzroči občutek draženja. V primeru preobčutljivostne reakcije ali draženja izdelek OROXID® forte prenehajte uporabljati. Občutek draženja je prehoden narave, ki po nekaj minutah ali po spiranju z vodo preneha. Izdelek OROXID® forte je namenjen le za lokalno uporabo v ustni votlini. Izdelek ni namenjen uživanju in ga po opravljenem žvrkljanju izpljunate. Izogibajte se stiku z očmi.

Stik z očmi: Stik izdelek OROXID® forte z očesom lahko povzroči blago draženje sluznice prebavil, bruhanje in diskro. Ob zaužitju večje količine gela ter ob pojavu hujših simptomov se posvetujte z zdravnikom.

Zaužitje: Ob zaužitju lahko izdelek OROXID® forte povzroči blago draženje sluznice prebavil, bruhanje in diskro. Ob zaužitju večje količine gela ter ob pojavu hujših simptomov se posvetujte z zdravnikom.

Vdihavanje: Izdelek OROXID® forte pri sobni temperaturi ne tvori znatnih količin hlapov vodikovega peroksida. Pri segrevanju lahko pride do akutnega vdihavanja vodikovega peroksida, ki lahko povzroči draženje v nosu, žrelu in dihalu.

Razlomite: Vsebnika ne odpipajte, da se vsebina ne razlije. Razlitvo vsebine s predmetom pobrišite z dovoljno količino papirja in si nato umijte roke.

4. Sestavine: Gel OROXID® forte vsebuje deioniziran vodo, 3-odstotno raztopino vodikovega peroksida, Actipone® PX3 (Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Zingiber Officinale Root Extract, Commiphora Myrrha Resin Extract, Echinacea Purpurea Extract), Aristoflex HMB, Sepinov EMT 10, arome in stabilizator.

5. Shranjevanje, rok uporabe: Gel OROXID® forte hrante pri sobni temperaturi od 5 °C do 25 °C. Rok uporabe izdelek je dve leti. Izdelek ne uporabljajte po preteklu roka uporabe. Shranjujte zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Uporabljajte le izdelek v nepoškodovanem vsebniku. Shranjujte nedosegljivo otrokom.



Upute za korištenje

Hrvatski

OROXID® forte – oralni gel

1. Opis proizvoda i svrha primjene: OROXID® forte je gel koji sadrži 3 % vodikovog peroksida i koristi se za održavanje oralne higijene i zdravih dlesni te kao pomoć kod upalnih stanja u usnoj šupljini. Namjenjen je prevenciji i ublažavanju bolesti parodontognih tkiva, npr. nadražene, krvaveće i upaljene desni. Pomaže u ublažavanju gingivitisa, paradontitisa, oštećenja desni uslijed zahvatna kao što je vađenje zuba. Pravilna oralna higijena neophodna je za prevenciju gingivitisa i drugih upalnih bolesti u usnoj šupljini. Nastanak gingivitisa uvjetovan je prisutnošću plaka i bakterija.

OROXID® forte zbog svojih mehaničkih svojstava i otpuštanja kisika u obliku blagog penjenja djeluje blagogtorno na mikrookruženje oštećene sluznice. Stoga ga preporučujemo kao dopunska oralnu higijenu kod fiksnih zubnih aparatova, djelomičnih protetika, fiksnih protetičkih nadomjestaka (navlaka, mostova) i zubnih implantata. Poboljšava rezultate oralne higijene kod pacijenata s ortodontskim nepravilnostima koje otježavaju normalnu dentalnu higijenu. Vodikov peroksid može pomoći pri sprečavanju nastanka zubnog plaka, promjene boje zuba i zadaha. Također pomaže u smanjenju naslaga na jeziku i oralnoj sluznici, obično uzrokovanih prisutnošću glivičnih patogena, te uklanja loš zadah. Delovanje je izraženo samo na površini, jer peroksid ne prodiре u dublja tkiva.

OROXID® forte sadrži kao pomoćnu tvar Actipone®PX3 – biljni ekstrakt.

Proizvod je dostupan u obliku gela u pakiranjima od 15 ml, 30 ml i 50 ml.

2. Način primjene: OROXID® forte se koristi dva do tri puta dnevno, najbolje nakon pranja zubi. Malu količinu OROXID® forte gela (dva do tri pritiska na zatvarač) nanesite na čist prst (temeljito opran sapunom i vodom) ili vatrani štapec i nanesite na zahvaćeno mjesto u usnoj šupljini. Ostavite djelovati 30 sekundi. Nakon tretmana gel promučajte s vodom i izpljuite.

Gel OROXID® forte redovito koristite dok se stanje ne popravi ili upala ne otkloni. Ako se stanje ne popravi u roku 8 tjedana, obratite se lječniku. Proizvod OROXID® forte nije namjenjen liječenju težih upalnih bolesti usne šupljine koje zahvaćaju i dublja tkiva; u tom slučaju postoji lječenja. U preventivne svrhe i za održavanje dobre oralne higijene koristite proizvod OROXID® forte na gore opisani način. Prilikom nanošenja gela može se pojaviti osjećaj penjenja, što ukazuje na oslobađanje aktivnog kisika.

3. Neželeni učinci i mjere opreza: Prilikom korištenja na sluznici, vodikov peroksid u niskim koncentracijama rijetko izaziva osjećaj iritacije. U slučaju reakcije preosjetljivosti ili iritacije prestanite koristiti proizvod OROXID® forte. Osjećaj iritacije prolazne je prirode i prestaje nakon nekoliko minuta ili nakon ispiranja vodom.

Proizvod OROXID® forte namijenjen je isključivo za lokalnu primjenu u usnoj šupljini. Proizvod nije namijenjen konzumiranju te ga nakon tretmana izpljuite. Izbjegavajte kontakt s očima.

Dodir s očima: Dodir proizvoda OROXID® forte s očima može izazvati iritaciju, suzjenje i zamagljen vid, ali ozbiljnije ožljede nisu vjerojatne. Ako gel dođe u dodir s očima, potrebno je zahvaćeno oko isprati tekućom vodom ili fiziološkom otopinom i po potrebi posjetiti lječnika.

Gutanje: Gutanjem proizvoda OROXID® forte može nastati blaga iritacija sluznice probavnog sustava, povraćanje i proljev. Posavjetujte se s lječnikom, ukoliko ste progutali veliku količinu gela ili ako se pojavio ozbiljni simptomi.

Udisanje: Proizvod OROXID® forte na sobnoj temperaturi ne stvara značajne količine para vodikovog peroksida. Prilikom zagrijavanja može doći do akutnog udisanja vodikovog peroksida, što može izazvati iritaciju u nosu, grdi i dišnom traktu.

Izbjeđivanje: Ne otvarjajte spremnik kako biste izbjegli izljevanje. Proliveni sadržaj s predmet obrišite dovoljnom količinom papira i zatim operite ruke.

4. Sastojci: Gel OROXID® forte sadrži deioniziran vodu, 3 % otopinu vodikovog peroksida, Actipone®PX3 (Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Zingiber Officinale Extract, Commiphora Myrrha Resin Extract, Echinacea Purpurea Extract), Aristoflex HBM, Sepinov EMT 10, arome i stabilizator.

5. Skladištenje, rok valjanosti: Gel OROXID® forte čuvajte na sobnoj temperaturi od 5 °C do 25 °C. Rok trajanja proizvoda je 2 godine. Ne koristite proizvod nakon isteka roka valjanosti. Čuvajte zaščiteno od izravne sunčeve svjetlosti. Koristite samo proizvod u neotešćenom spremniku. Čuvajte izvan dohvatna djece.

