

Diosmolyte®

3 g diosmektita + elektroliti
vrečke s praškom za pripravo peroralne suspenzije

12 vrečk medicinskega pripomočka za enkratno uporabo  0426

SESTAVA

Ena vrečka praška vsebuje diosmektit 3,00 g, natrijev klorid 0,263 g, kalijev klorid 0,0373 g, brezvodni trikalijev citrat 0,162 g, trinatrijev citrat 0,147 g, glukoza (brezvodna dekstroza) 1,982g.

Pomožne snovi: vanilin, natrijev saharin, silicijev dioksid, aroma smetane, aroma vanilije; barvilo: betakaroten.

OPIS MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA IN NAVODILA ZA UPORABO

Diosmolyte® je medicinski pripomoček za enkratno uporabo v obliki vrečk s praškom za pripravo peroralne suspenzije. Vsaka vrečka je namenjena enkratni uporabi po odpiranju. Vsebino ene vrečke je potrebno raztopiti v 100 ml vode. Za pripravo homogene suspenzije, prašek stresemo v kozarec, dodamo vodo in počasi mešamo. Priporočljivo je, da se **Diosmolyte®** jemlje med obroki.

INDIKACIJE

Peroralno zdravljenje akutne in kronične driske ter bolečih simptomov, povezanih z boleznimi prebavil. **Diosmolyte®** je indiciran za profilakso driske zaradi radioterapije in kemoterapije.

PRIPOROČEN ODMEREK

Za prve tri dni:

Otroci nad 2 leti: do 4 vrečke na dan.

Odrasli: do 6 vrečk na dan.

Nato nadaljujte s polovičnim odmerkom, dokler driska popolnoma ne mine.

TRAJANJE ZDRAVLJENJA

Diosmolyte® se ne sme uporabljati več kot 5 zaporednih dni. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom.

KAKO DIOSMOLYTE® DELUJE?

Ena vrečka izdelka **Diosmolyte®** vsebuje diosmektit in elektrolite.

Diosmektit je vrsta naravne glin, za katero je značilna kristalinična struktura zelo tankih prekrivajočih se trakov, ki dajejo visoko

absorpcijsko moč, ki omogoča, da diosmektit veže tekočino iz črevesnega lumna in s tem poveča konsistenco blata ter upočasni izločanje. Na ta način **Diosmolyte®** zmanjša tudi tveganje za dehidracijo zaradi driske in pomaga pri vračanju elektrolitskega ravnovesja v normalno stanje, zahvaljujoč uravnoteženemu odmerku elektrolitov. Moč absorpcije diosmektita omogoča interakcijo **Diosmolyte®** z glikoproteini v membrani sluznice, ki prekriva gastroduodenalno steno, tako da spremeni njihove fizikalne lastnosti in tvori zaščitni gel, ki ščiti pred hipersekrecijo kislin in drugimi škodljivimi snovi.

VARNOST IN OPOZORILA PRED UPORABO

V primeru sočasnega zdravljenja z drugimi zdravili ali medicinskimi pripomočki poiščite zdravniški nasvet.

Diosmolyte® shranjujte izven dosega otrok. Ne uporabljajte **Diosmolyte®**, če originalna embalaža ni popolnoma nepoškodovana. Ne uporabljajte **Diosmolyte®** po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na embalaži.

OPOZORILA

Visoka absorpcijska moč diosmektita lahko moti absorpcijo nekaterih peroralno zaužitih zdravil. Zaradi tega je potrebno vzeti zdravila ločeno od **Diosmolyte®**.

Diosmolyte® ne smejo jemati osebe, ki trpijo z zaprtjem. Osebe s sladkorno boleznijo ali na dieti morajo upoštevati, da **Diosmolyte®** vsebuje sladkorje. Če jemljete zdravila, se posvetujete z zdravnikom preden vzamete izdelek.

Med nosečnostjo in dojenjem se posvetujte z zdravnikom pred jemanjem izdelka.

Brez glutena.

Uporablja se lahko pri otrocih, starejših od 2 let.

ROK UPORABE IN SHRANJEVANJE

Diosmolyte[®] ima rok uporabnosti 36 mesecev in se ne sme uporabljati po roku uporabnosti navedenemu na embalaži.

Diosmolyte[®] je potrebno shranjevati na sobni temperaturi. Izdelek je potrebno zaščititi od neposredne sončne svetlobe, virov toplote, vlage ali vode.

Rok uporabnosti se nanaša na nepoškodovan in pravilno shranjen izdelek.

PROIZVAJALEC

Pharma Line S.r.l.,
Via Bertani 2 - 20154 Milan,
Italija

DISTRIBUTER

Grandevita d.o.o.,
Zlatek 15, 1000 Ljubljana,
Slovenija

RAZLAGA OZNAK NA EMBALAŽI



MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA ENKRATNO UPORABO



PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA



HRANITI NA TEMPERATURI MED 0°C IN 40°C



ZAŠČITITI OD NEPOSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI SONČNI SVETLOBI IN DRUGIM VIROM TOPLOTE



ZAŠČITITI OD VLAGE IN KONTAKTA Z VODO



OPOZORILO



PROIZVAJALEC



LOT ŠTEVILKA



ROK UPORABE



MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Zaključek dokumenta : Rev.00 / 27. 04. 2023.

